

TALADRO DE LOS FORESTALES

Morpheis sp.



Larva de *Morpheis sp.* Foto: M. Dabul

Ing. Agr. Florencia Cecilia Trabichet (...)

Descripción

Los adultos son mariposas de hábitos nocturnos, de colores oscuros, con abdomen cilíndrico terminado en punta; los machos tienen las antenas bipectinadas solo en la base, con el cuerpo cubierto de pelos blancos y negros entremezclados. La hembra mide 80 mm de expansión alar y el macho es notablemente más pequeño alcanzando los 60 mm en ese parámetro. En ambos sexos las alas tienen una coloración oscura con diseño amarillento

oscuro. Las larvas con cabeza oscura con líneas claras esfumadas correspondientes a las suturas y a las ramas adfrontales. Dorso del pronoto de igual color que la cabeza con una mancha subtriangular medial, resto del abdomen y tórax con segmentos con la mitad apical rojizo claro y el resto amarillento en la basal. Resto del segmento amarillento. Patas rojizo claro.

Daño

Las larvas perforan la madera del árbol (álamos, sauces, pecanes) barrenándola para alimentarse ocasionando daños mecánicos, lo que puede conllevar a la quebradura de ramas en caso de infestaciones muy altas. Hasta el momento no se han reportado grandes daños en

plantaciones de Pecán que comprometan la sanidad y la producción del cultivo.



Biología



Ciclo completo desconocido. Los adultos aparecen en enero y febrero y colocan sus huevos en las resquebrajaduras de la corteza cubriéndolos con una secreción amarillenta. Cuando las larvas eclosionan se alimentan de la madera cavando galerías.

Control



El control debe estar dirigido a la eliminación de adultos en la época que se presentan (enero y febrero). No se conocen enemigos naturales.

